

VENI' integratore alimentare a base di ippocastano e troxerutina

Vení è un integratore alimentare a base di ippocastano e troxerutina, estratti che possono aiutare a contrastare l'affaticamento delle gambe contribuendo a favorire la funzionalità del microcircolo.

Confezione: flacone da 30 compresse

Modalità d'uso: assumere 1 capsula due volte al giorno dopo i pasti principali.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti (2 capsule)

Ippocastano corteccia e.s.	320 mg
apporto in escina	9,6 mg
Troxerutina	320 mg

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

VENI'

L'*ippocastano* è storicamente utilizzato nel trattamento dell'insufficienza venosa. Il suo principio attivo è l'*escina*, contenuta nei semi e nella corteccia della pianta. L'*escina* è una miscela di saponine triterpeniche efficaci nell'aumentare il tono venoso e la resistenza capillare, nel ridurre la permeabilità capillare, nel ridurre la filtrazione transcapillare di liquidi e nel favorire la rimozione dei liquidi interstiziali (azione antiedemigena). Oltre che nell'insufficienza venosa degli arti inferiori, gli estratti di ippocastano si sono dimostrati utili nel trattamento della sindrome emorroidaria.

La *troxerutina* è un flavonoide presente in molte specie di frutta e verdura, oltre che nel tè e nei cereali, la cui attività farmacologica consiste nel ridurre la filtrazione a livello capillare favorendo il riassorbimento dell'edema da insufficienza venosa. La *troxerutina*, inoltre, è efficace nell'infiammazione dell'endotelio venoso, con conseguenti proprietà antitrombotiche.

Bibliografia essenziale

- 1) Panigati, D. The pharmacology of escin a saponin of *Aesculus hippocastanum* L. III. Pharmacokinetics and toxicology. Boll. Chim. Farm. 1992;131:320–321.
- 2) Vin F. Chabanel A., Tacoen A. Double-Blind Trial of the Efficacy of Troxerutin in Chronic Venous Insufficiency. Phlebology 1994;9:71-76.

Nota: le informazioni riportate nella presente scheda tecnica, non intendono sostituire i consigli del Medico, al quale spettano eventuali prescrizioni ed indicazioni terapeutiche. Queste indicazioni sono da ritenersi solamente una guida informativa da non divulgare al pubblico, sono riservate esclusivamente agli operatori qualificati nei settori della Medicina, Alimentazione e Farmacia (Art. 6 comma II del D.L. 111 del 27/01/1992)